

آیا عمل جراحی در فتق ضروری است؟

جراحی برای بستن سوراخ ضروری است بدون جراحی ممکن است محتویات شکم از طریق این سوراخ بیرون بیاید و گیر بیفتد و آن قسمت از روده سیاه شده و از بین برود.



کودک من چند روز در بیمارستان بستری خواهد بود؟

عمل جراحی فتق نیازی به بستری چند روز قبل عمل ندارد معمولا یک روز قبل عمل بستری شده و روز عمل هم در صورت نداشتن مشکل خاص خواهد شد.

قبل عمل چه اقداماتی لازم است؟

* از حدود ۸-۴ ساعت قبل عمل (بسته به سن کودک) چیزی از راه دهان به کودک داده نخواهد شد.

* انجام یک سری آزمایشات خون هم ضروری است.

اگر بچه ای تب دار باشد باز هم عمل را انجام می دهید؟

در صورت داشتن تب و علائم سرما خوردگی بهتر است عمل کودک شما تا بهبودی کامل به تاخیر بیفتد.

در طول عمل جراحی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

- نوع بیهوشی شما از نوع بیهوشی عمومی است.
- جراحی یک سوراخ کوچک روی شکم باز می کند و بعد از بستن فتق مجددا آن را می بندد.
- عمل ۱-۱/۵ ساعت طول می کشد.

کودک من کی قادر خواهد بود که به منزل برود؟

- وقتی که کاملا بیدار شده باشد که حدودا ۲-۳ ساعت طول می کشد.
- بتواند به خوبی مایعات بخورد.
- دارای ضربان قلب و تنفس های طبیعی باشد.
- بعد از عمل ادرار کرده باشد.
- استفراغ و خونریزی



هدف از این پمفلت این است که به شما در مورد فتق اینگوینال و آنچه که باید قبل و حین و بعد عمل انجام دهید اطلاعاتی بدهد.

فتق اینگوینال چیست؟

- فتق یک سوراخ مادرزادی یا اکتسابی است که در جدار شکم ایجاد می شود و ممکن است محتویات شکم نظیر روده باریک از طریق آن سوراخ بیرون بزنند و بعضی وقت ها به شکل یک حباب زیر پوست کودک شما به وجود می آید.
- اگر کودک شما فتق دارد ممکن است شما در کشاله ران او تورم مشاهده کنید.
- فتق در پسرها شایعتر از دخترها است و در بچه های نارس هم بیشتر دیده می شود.
- فتق ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
اسان مکیلیو و بیراجو
یارسان امام سجاد (ع)

فتق

(راهنمای والدین)



تهیه کنندگان:

آسیه قلی زاده
سرپرستار بخش نوزادان
صدیقه سادات
رابط آموزشی
تایید کننده:
واحد آموزش پرستاری

خرداد ۹۸

در موارد زیر باید سریعاً به پزشک
مراجعه کنید:

وقتی که کودک شما:

- دردی دارد که با هیچ مسکنی بهتر نمی شود.
- تب بالای ۳۸ درجه دارد.
- خونریزی از محل عمل دارد که با ۵ دقیقه فشار مستقیم قطع نمی شود.
- از محل زخم ترشح چرکی دارد.
- ناحیه وسیعی از اطراف زخم قرمز شده باشد.
- در طول ۱۲ ساعت ادرار نداشته باشد.

این پمفلت بر پایه آخرین اطلاعات در دسترس پزشکی و پرستاری تدوین شده است ولی برای کودکی ممکن است ملاحظات خاصی لازم باشد که باید بر پایه تشخیص و وضعیت اختصاصی وی تدوین شود لذا این پمفلت تنها بعنوان خطوط راهنما بوده و به هیچ وجه جایگزین توصیه های پزشک معالج کودک شما نمی باشد.

اگر شما توصیه یا اطلاعات بیشتری نیاز دارید لطفاً با شماره ۰۱۶۴۰۳۳۲۲ تماس بگیرید.



چطور می توانم از کودکم در منزل مراقبت کنم؟

کنترل درد: کودک شما ممکن است چند روز اول بعد عمل به مسکن نیاز داشته باشد که توسط جراح داروی مسکن نوشته می شود. (این عمل نیازی استفاده از آنتی بیوتیک ندارد.)

تغذیه: کودک شما همه چیز می تواند بخورد ولی برای کارکرد بهتر شکم ترجیحاً مایعات بیشتری داده شود.

فعالیت: عمل فتق هیچ محدودیتی برای کودک شما ایجاد نمی کند ولی به هر حال باید از بازیهای مثل دوچرخه سواری و شنا به مدت دو هفته پرهیز کنند.

حمام دادن: ۴۸ ساعت بعد عمل کودک شما می تواند حمام کند.

پانسمان: ۴۸ ساعت بعد عمل پانسمان اولیه برداشته شود و دیگر نیازی به پانسمان مجدد نیست.

بخیه ها: ۱۰-۷ روز بعد عمل بیمار توسط جراح ویزیت می شود و بخیه ها برداشته می شود. تورم ناحیه فتق در عرض چند روز برطرف

