



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بیمارستان آموزشی درمانی امام سجاد (ع)

کاوازاکی



گرد آورنده: جوکار (-رابط آموزشی)

➤ در صورت مشاهده علائم مسمومیت با
آسپرین شامل:

وزوز گوش, سردرد, سرگیجه, کبودی بی

دلیل

خونریزی از بینی, خلط خونی, خون در

استفراغ, خون در مدفوع به پزشک مراجعه
نمایید.

آموزشهای لازم جهت والدین:

علائم و نشانه ها

➤ بی قراری کودک تا دو ماه بعد از اولین

علامت ممکن است ادامه داشته باشد.



➤ رنگ پریدگی دست و پا

➤ سردی و پایین بودن درجه حرارت و گرفتگی

عضلات بعد از بیدار شدن

➤ درد مفاصل تا چند هفته ادامه دارد.

➤ ثبت درجه حرارت و اطلاع به پزشک در

صورت تب بالای ۳۸

کاووازاکی

این بیماری با علت ناشناخته باعث التهاب عروق خونی در سرتاسر بدن می شود.

یکی از دلایل اصلی بیماری قلبی در کودکان بیماری کاوازاکی است که واگیردار هم نمی باشد.



در این بیماری عوامل عفونی، عوامل محیطی، سم تولید شده توسط باکتری ها نیز ممکن است موثر باشد.

علائم بیماری:

- ✓ تبی که به آنتی بیوتیک جواب نمی دهد و بیش از ۵ روز طول می کشد.
- ✓ قرمزی هر دو چشم
- ✓ مخاط دهان با لبهای ترک خورده
- ✓ برجستگی غدد لنفاوی گردن به صورت یک طرفه که دردناک نمی باشد.
- ✓ دانه های قرمز رنگ روی پوست در هنگام شروع بیماری
- ✓ تورم پشت دست و پا بدون قرمزی که دردناک نیز می باشد.



درمان:

تمامی بیماران مبتلا به کاوازاکی باید بستری شوند و برای پیشگیری از آسیب عروقی به قلب درمان با ایمونوگلوبین داخل وریدی آغاز میشود. همچنین آسپرین و آنتی اسید نیز جهت جلوگیری از سکت در بیمار تجویز می شود.

مراقبت های پرستاری

- کنترل درجه حرارت
- بررسی صداهای قلبی از نظر نارسایی قلبی
- معاینه چشم از نظر کونژکتیویت
- معاینه غشاهای مخاطی از نظر التهاب
- بررسی اندامها از نظر ادم و قرمزی
- کنترل جذب و دفع
- رژیم غذایی نرم و مایعات که خیلی سرد و گرم نباشد.
- کنترل وزن روزانه
- انجام حرکات انقباض و انبساط ماهیچه ها